



Семінар: «Вектори»

Викладач: Мальцев Олександр Михайлович

Сума векторів

Сума 4 одиничних векторів дорівнює нулю. Доведіть, що їх можна розбити на дві пари протилежних векторів.

Розв'язок

Із цих векторів можна скласти опуклий чотирикутник. Довжини всіх сторін цього чотирикутника дорівнюють 1, тому він — ромб; пари його протилежних сторін – шукане розбиття.

Сума векторів

Нехай M та N - середини сторін AB і CD чотирикутника $ABCD$. Доведіть, що якщо $MN = (BC + AD)/2$, то $ABCD$ - трапеція.

Розв'язок

$$\begin{aligned} \overline{MN} &= \overline{MB} + \overline{BC} + \overline{CN} & \overline{MN} &= \overline{MA} + \overline{AD} + \overline{DN} \\ \overline{MA} &= -\overline{MB} & \overline{CN} &= \overline{DN} \end{aligned}$$

Запишемо векторні рівності

Складемо ці рівності, зазначивши, що

отримуємо: . Оскільки довжина суми векторів не перевищує суми довжин векторів, то MN завжди не більше, ніж $(BC + AD)/2$. Крім того, рівність досягається тільки у випадку, коли вектори BC і AD колінеарні, тобто коли $ABCD$ - трапеція з основами BC і AD .

Скалярний добуток

Доведіть, що коли діагоналі чотирикутника $ABCD$ перпендикулярні, то і діагоналі будь-якого іншого чотирикутника з такими ж довжинами сторін перпендикулярні.

Розв'язок

Нехай $\mathbf{a} = \overline{AB}$, $\mathbf{b} = \overline{BC}$, $\mathbf{c} = \overline{CD}$, $\mathbf{d} = \overline{DA}$.

Достатньо перевірити, що

коли $a^2 + c^2 = b^2 + d^2$. Ясно,

що $d^2 = |\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}|^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2[(\mathbf{a}, \mathbf{b}) + (\mathbf{b}, \mathbf{c}) + (\mathbf{c}, \mathbf{a})]$.

Тому умова $a^2 + c^2 = b^2 + d^2$, тобто $0 = (\mathbf{a} + \mathbf{b}, \mathbf{b} + \mathbf{c})$

$= b^2 + (\mathbf{b}, \mathbf{c}) + (\mathbf{a}, \mathbf{c}) + (\mathbf{a}, \mathbf{b})$, еквівалентна тому,

що $d^2 = a^2 + b^2 + c^2 - 2b^2$.

Обертанья

Из произвольной внутренней точки O выпуклого n -угольника опущены перпендикуляры на стороны (или их продолжения). На каждом перпендикуляре от точки O по направлению к стороне построен вектор, длина которого равна половине длины той стороны, на которую опущен перпендикуляр. Определить сумму построенных векторов.

Решение: Если мы повернём указанные векторы на 90° и умножим их на 2, то они превратятся в векторы сторон многоугольника. Сумма векторов сторон многоугольника равна $\vec{0}$, поэтому сумма исходных векторов тоже равна $\vec{0}$.

Конец