

# **Синдром желудочной диспепсии**

# Жалобы

- Снижение аппетита
- Изжога
- Отрыжка
- Тошнота
- Рвота
- Боли в эпигастрии

# Анамнез

- Эзофагиты, ГЭРБ
- Язвенная болезнь
- Гастриты
- Употребление некачественной пищи
- Заболевания печени, поджелудочной железы, желчного пузыря

# Объективные данные

- Язык влажный, обложен налетом (белым, желтоватым, др.)
- Живот обычной формы, симметричный
- Определить нижнюю границу желудка
- Болезненность при пальпации в области эпигастрия, в правом подреберье

# Лабораторные данные

1. ОАК: умеренный лейкоцитоз, повышение СОЭ
2. ИФА на *H.pylori* – высокий титр
3. Определение pH желудочного сока: гипо- или гиперацидность

# ФЭГДС

- Слизистая пищевода гиперемирована, отечная, кардия зияет
- Гиперемия, отечность слизистой желудка, перистальтика активная
- Слизистая желудка бледная, атрофирована, складки сглажены
- Эрозии, язвы пищевода, желудка, ДПК с указанием размеров, количества, глубины и т.д.

# Принципы лечения данного синдрома

- Диета
- Частое дробное питание
- Антациды
- Н-2 блокаторы
- Ингибиторы протонной помпы
- Антибиотики
- Препараты висмута