

**Сүлелі жүрек
жетіспеушілігі синдромы
(ЖІІА)**

ШАҒЫМЫ

- Ентігу, инспираторлық басым
- әлсіздік, тез шаршау

Анамнез

- Артериялық гипертензия
- Жүрек ақауы
- Кардиомиопатиялар: дилатациялық, гипертрофиялық, рестрикциялық
- ЖИА

Объективті мәлімет

- Ортопноэ
- Ерін және тырнақ цианозы
- Бәсең ылғалды сырылдар
- Жүрек түрткісі солға ығысуы
- Перкуссияда: сол жақ шекарасы солға және жоғары ығысқан
- Аускультацияда: синусты тахикардия, систолалық шу, ат шабысы ырғағы, ӨА-да Ітон акценті

Аспаптық зерттеулер

- ЭхоКГ: СЖ дилатациясы, СҚ гипертрофиясы және дилатациясы, СҚ лақтырыс фракциясы <50%
- R-графия кеуде қуысы: жүрек неізі ұлғаюы, өкпе суреті күшеюі, кіші қанайналым шеңберінде тоқырау. Жүрек көлеңкесінің сол жақ III,IV доғалары ұлғаюы

СЖЖ емдеу принциптері

- Ас тұзын қолдануды шектеу
- Шамамен физикалық күштемелер
- ААФи (Эналаприл, лизиноприл, периндоприл)
- ангиотензин II рецепторлары антагонистері (валсартан, кандесартан)
- β -адреноблокаторлар (карведилол, небиволол, бисопролол)
- жүрек гликозидтері (дигоксин)
- Диуретиктер
- Антиагреганттар
- Хирургиялық ем