


СОМАТОТИПЫ И ИХ КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.

Зубило Илья, 128 группа.

ТИПОЛОГИЯ КРЕЧМЕРА




астенический


атлетический

пикнический


ТИПОЛОГИЯ ШЕЛДОНА




ЭКТОМОРФ



ΜΕΣΟΜΟΡΦ



ЭНДОМОРФ






а) Преобладающий эндоморфный 7-1-1



б) Преобладающий мезоморфный 1-7-1



в) Преобладающий эктоморфный 1-1-7




г) Сбалансированное телосложение 4-4-4



A

Б



С

Д

ИНДЕКС ПИНЬЕ

Определяется тип конституции по индексу физического развития (индекс Пинье), который определяется по формуле:

$$\text{ИП} = L - (P+T),$$

где L – длина тела (см),

P – масса тела (кг),

T – окружность грудной клетки (см).

ЖЕНСКАЯ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА И.Б. ТАЛАНТА

Лептосомные

Астенический

Стенопластически
й

Мезосомные

Мезопластический

Пикнический


Мегалосомные

Субатлетический


Атлетический

Эурипластический


АСТЕНИЧЕСКИЙ



СТЕНОПЛАСТИЧЕСКИЙ



МЕЗОПЛАСТИЧЕСКИЙ




ПИКНИЧЕСКИЙ




СУБАТЛЕТИЧЕСКИЙ



АТЛЕТИЧЕСКИЙ




ЭУРИПЛАСТИЧЕСКИЙ




**КЛАССИФИКАЦИЯ
ТИПОВ ЖЕНСКИХ
ФИГУР В
ПРАКТИКЕ
ДИЕТОЛОГОВ.**


АНДРОИДНЫЙ




ГИНЕКОИДНЫЙ



ТИРЕОИДНЫЙ




ЛИМФАТИЧЕСКИЙ




КОНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА В.В. БУНАКА







1




2




3




4




5



6





7



8

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭПИГАСТРАЛЬНОГО (НАДЧРЕВНОГО) УГЛА



СООТВЕТСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССИФИКАЦИЙ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ.

- Астеник, эктоморф, гипостеник, лептосомные (ж), грудной (м), долихоморфный тип.
- Пикник, эндоморф, гиперстеник, мезосомные (ж). брюшной (м), брахиморфный тип.
- Атлетик, мезоморф, нормостеник, мегалосомные (ж), мускульный (м), переходный тип.

СПАСИБО

ЗА

ВНИМАНИЕ