

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ИНВАЛИДАМИ С СУИЦИДАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ



Подготовила:

Студенка группы С-32

Белова Раиса

Древние философы обратили внимание на проблему суицидального поведения (Сократ, Аристотель, Платон, Кант и др.), однако причинами суицидального поведения интересуются и современные ученые: К.В. Зорин, В.Э. Чудновский, Ф. Арьес и др. Основной причиной суицидальности, с точки зрения философии, является проблема потери смысла жизни.



Содержание социальной работы с инвалидами

Инвалид — это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.

Все инвалиды по разным основаниям делятся на несколько групп: По возрасту , По происхождению инвалидности, По степени трудоспособности, По характеру заболевания .



Социальное обслуживание осуществляется по решению органов социальной защиты населения в подведомственных им учреждениях либо по договорам, заключенным органами социальной защиты с учреждениями социального обслуживания иных форм собственности (ст. 5 Закона).



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЕ СУИЦИДА И ЕГО ПРИЧИНЫ

Самоубийство, суицид (от лат. *sui caedere* — убивать себя) — целенаправленное лишение себя жизни, как правило, добровольное, хотя бывают и случаи вынужденного самоубийства, и самостоятельное. Чрезвычайно сложный этический вопрос представляет в этом смысле эвтаназия.



Суицидальное поведение —

различны
обусловл
себя жи
разреш
возни
личнос
удовлет
потребностей.

людей,
ИШИТЬ
СТВОМ
ИЗИСА,
НИИ
ПУТИ
ИШИХ



- Суицидальные замыслы — это более активная форма проявления суицидальности. Тенденция к самоубийству нарастает в форме разработки плана: продумываются способы, время и место самоубийства.
- Суицидальные намерения появляются тогда, когда к замыслу присоединяется волевой компонент — решение, готовность к непосредственному переходу во внешнее поведение.
- Суицидальная попытка — это целенаправленное оперирование средствами лишения себя жизни, не закончившееся смертью. Попытка может быть обратимой и необратимой, направленной на лишение себя жизни или на другие цели.
- Завершенный суицид — действия, завершенные летальным исходом.



Социальная работа предотвращения суицида среди инвалидов



Ввиду недостаточной ясности причин, суицидального поведения и его несомненной взаимосвязи с другими видами девиантного поведения, возможно использование комплексных программ реабилитации для людей, относящихся к «группам риска развития суицидального поведения».



Эти программы направлены на поддержание общего тонуса клиентов, сохранение и развитие круга общения, установление новых контактов, являющихся мощным средством, удерживающим в жизни; а также развитие социальных навыков, отработку травматичных переживаний, личностный рост.





Далее могут возобновиться
суицидальные намерения, так
как проблема неудачливого
суицидента связана именно с
ближайшим окружением.
Поэтому необходимо работать с
семьей суицидента.



Диагностики на выявление склонности к суициду

- В констатирующем этапе эксперимента в нашем исследовании приняли участие 10 испытуемых в возрасте 10-14 лет.
- Целью констатирующего этапа эксперимента является изучение взаимосвязи депрессивности и агрессивности со склонностью к суициду, были использованы:
- Для исследования были выбраны: опросник депрессии Бека, опросник депрессии Бека



ЭКСПЕРИМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ИНВАЛИДАМИ СКЛОННЫМИ К СУИЦИДАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

Организация
суицидологической помощи
— система лечебно-
профилактических
мероприятий,
направленных на оказание
специализированной
помощи больным с
суицидальными
(аутоагрессивными)
проявлениями




Включает следующие этап
экстренной помощи: первичной
помощи, амбулаторно-
консультационной помощи.



- Использовали в работе с данной категорией программу социально-психологических тренингов, направленную на профилактику и коррекцию аутоагрессивных форм поведения личности. Внедрение данной программы способствует закреплению несуйцидальных форм поведения.
- Были проведены занятия «Знакомство» , «Доверие», «Коммуникация» , «Невербальное общение» , «Самоанализ и самопознание» , «Конфликтность и способность работать в коллективе»





- личная жизнь
- проблемы в семье
- непонимание
- потеря смысла жизни
- проблемы со здоровьем
- проблемы в школе



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

□ Наверное, можно утверждать, что в определении ранение самоубийства отравление



□ Видимо, самоубийства будут бегство от жизни и что всегда ания и

смерть, инвалидность.

