

# **СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ИНВАЛИДАМИ С СУИЦИДАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ**



**Подготовила:**

**Студенка группы С-32**

**Белова Раиса**

Древние философы обратили внимание на проблему суицидального поведения (Сократ, Аристотель, Платон, Кант и др.), однако причинами суицидального поведения интересуются и современные ученые: К.В. Зорин, В.Э. Чудновский, Ф. Арьес и др. Основной причиной суицидальности, с точки зрения философии, является проблема потери смысла жизни.



# Содержание социальной работы с инвалидами

Инвалид — это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.

Все инвалиды по разным основаниям делятся на несколько групп: По возрасту , По происхождению инвалидности, По степени трудоспособности, По характеру заболевания .



Социальное обслуживание осуществляется по решению органов социальной защиты населения в подведомственных им учреждениях либо по договорам, заключенным органами социальной защиты с учреждениями социального обслуживания иных форм собственности (ст. 5 Закона).



# ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЕ СУИЦИДА И ЕГО ПРИЧИНЫ

**Самоубийство, суицид** (от лат. *sui caedere* — убивать себя) — целенаправленное лишение себя жизни, как правило, добровольное, хотя бывают и случаи вынужденного самоубийства, и самостоятельное. Чрезвычайно сложный этический вопрос представляет в этом смысле эвтаназия.



# Суицидальное поведение —

различны  
обусловл  
себя жи  
разреш  
возни  
личнос  
удовлет  
потребностей.

людей,  
ИШИТЬ  
СТВОМ  
ИЗИСА,  
НИИ  
ПУТИ



- Суицидальные замыслы — это более активная форма проявления суицидальности. Тенденция к самоубийству нарастает в форме разработки плана: продумываются способы, время и место самоубийства.
- Суицидальные намерения появляются тогда, когда к замыслу присоединяется волевой компонент — решение, готовность к непосредственному переходу во внешнее поведение.
- Суицидальная попытка — это целенаправленное оперирование средствами лишения себя жизни, не закончившееся смертью. Попытка может быть обратимой и необратимой, направленной на лишение себя жизни или на другие цели.
- Завершенный суицид — действия, завершенные летальным исходом.



# Социальная работа предотвращения суицида среди инвалидов



Ввиду недостаточной ясности причин, суицидального поведения и его несомненной взаимосвязи с другими видами девиантного поведения, возможно использование комплексных программ реабилитации для людей, относящихся к «группам риска развития суицидального поведения».





Эти программы направлены на поддержание общего тонуса клиентов, сохранение и развитие круга общения, установление новых контактов, являющихся мощным средством, удерживающим в жизни; а также развитие социальных навыков, отработку травматичных переживаний, личностный рост.





Далее могут возобновиться  
суицидальные намерения, так  
как проблема неудачливого  
суицидента связана именно с  
ближайшим окружением.  
Поэтому необходимо работать с  
семьей суицидента.



# Диагностики на выявление склонности к суициду

- В констатирующем этапе эксперимента в нашем исследовании приняли участие 10 испытуемых в возрасте 10-14 лет.
- Целью констатирующего этапа эксперимента является изучение взаимосвязи депрессивности и агрессивности со склонностью к суициду, были использованы:
- Для исследования были выбраны: опросник депрессии Бека, опросник депрессии Бека



# ЭКСПЕРИМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ИНВАЛИДАМИ СКЛОННЫМИ К СУИЦИДАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

Организация  
суицидологической помощи  
— система лечебно-  
профилактических  
мероприятий,  
направленных на оказание  
специализированной  
помощи больным с  
суицидальными  
(аутоагрессивными)  
проявлениями




Включает следующие этап  
экстренной помощи: первичной  
помощи, амбулаторно-  
консультационной помощи.



- Использовали в работе с данной категорией программу социально-психологических тренингов, направленную на профилактику и коррекцию аутоагрессивных форм поведения личности. Внедрение данной программы способствует закреплению несуйцидальных форм поведения.
- Были проведены занятия «Знакомство» , «Доверие», «Коммуникация» , «Невербальное общение» , «Самоанализ и самопознание» , «Конфликтность и способность работать в коллективе»





- личная жизнь
- проблемы в семье
- непонимание
- потеря смысла жизни
- проблемы со здоровьем
- проблемы в школе



# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

□ Наверное, можно утверждать, что в определении ранение самоубийства отравление



□ Видимо, самоубийства будут бегство от жизни и что всегда ания и

смерть, инвалидность.

