




«Тайга»

*Підготува студентка
II курсу, групи Г
ГПК МДУ
Сакаль Жанна*

Тайга— це біом хвойних лісів помірнього та частково субарктичного поясу Північної півкулі. Тайга займає більшу частину Канади, Швеції, Фінляндії, Норвегії та Росії (особливо Сибіру), частину Аляски, північно-східного Китаю, крайній північний схід Естонії, а також деяких районів на крайній півночі Монголії та основну територію штатів Орегон та Вашингтон (США) і Шотландії, і є найбільшим суходільним біомом.



Територія зайнята Тайгою

За видовим складом розрізняють **світлохвойна** (сосна звичайна, деякі американські види сосни, модрина сибірська і даурская) і більш характерну і поширену **темнохвойну тайгу** (ялина, ялиця, кедрова сосна). Деревні породи можуть утворювати **чисті** (ялинові, модринові) і **змішані** (ялицево-смерекові) **деревоستاني.**



Природні умови Тайги

Кліматична зима триває тут 5-6 місяців, з середніми температурами нижче 0 °С. Температури варіюють від -50 °С до +30 °С протягом року, при цьому 8 і більше місяців середня температура менша за +10 °С. Літо коротке, але досить тепле та вологе.



У тайзі ростуть
дерева, які не дуже
вимогливі до тепла,
- це **хвойні дерева**. У
хвойних дерев
листя - це хвоїнки,
вони завжди зелені.
Це високі дерева з
могутнім корінням.

- **ялина**
- **сосна**
- **ялиця**
- **модрина**
- **кедр**



Ялина (Picea Dietrich)

У ялини хвоїнки короткі, грубуваті, розташовані поодинці і густо покривають гілки. Шишки мають довгасту форму. Ялинки - довгожителі. У ялиновому лісі темно і волого.



Сосна(лат. *Pinus*)

Хвойне дерево з рівним стовбуром жовтуватого кольору. Хвоїнки сосни довгі, сидять парами. Шишки сосни мають округлу форму. Соснові ліси світлі і сухі.



Ялиця (Abies)

Хвоїнки ялиці плоскі, а шишки стирчать вгору і навіть зрілі не падають на землю.



Модрина (Larix)

Єдине з хвойних дерев, яке на зиму скидає голки.



Кедр(лат. Cedrus)

***Хвоїнки кедр зібрані в пучки по п'ять штук,
насіння кедрові горішки.***



Фауна

Тайга є притулком великої кількості травоїдних ссавців та гризунів, що також адаптовані до виживання в різко континентальному кліматі.

Численні і широко поширені : рись , росомаха , бурундук , соболь , білка і ін З копитних зустрічаються північний і Благородний олень , лось , косуля ; численні зайці , бурозубки , гризуни : миші , полівки , білки звичайна і летяга , бурундуки . З птахів звичайні: глухар , звичайний рябчик , кедровка , клести та ін У таежном лісі в порівнянні з лісотундрою сприятливішими умови для життя тварин. Тут більше осілих тварин. Ніде в світі , крім тайги , не водиться стільки хутрових звірів.

У зимовий період переважна кількість видів безхребетних , все земноводні і плазуни , а також деякі види ссавців занурюються в анабіоз і зимову сплячку , знижується активність ряду інших тварин.

Лось – типовой представник фауни копитних тайги



Рись (Lynx) — рід хижих ссавців з родини котових (Felidae), найбільш близький власне до роду Кіт (Felis).



Telefoner

Літцяга, інколи летцяга (Glaucomys) — рід гризунів родини вивіркових (Sciuridae), представник підроддини політухові.



Всяко-Разно

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!

