

Тақырыбы:

Вольф- Паркинсон-Вайт синдромы

- Дайындаған: Бидаш А.М
- Топ-10-29-1
- Факультет: ЖМ
- Курс- 5

Жоспары:

ВПВсиндромы себебі

ВПВ синдромы симптомдары

ВПВ емі


- 1930 жылы L.Wolff, J.Parkinson және P.White осы синдромға алғаш түсінктеме берген. ЭКГ-синдром “Гисс шоғыры аяқшаларының функциональды блокадасы ” және қысқа интервалды P-R, тахикардиялық ұстамалармен қиналатын, бірақ физикалық сау жас адамдар зиян шегетін синдром түрі.

Вольф-Паркинсон-Вайт синдромы — бұл жүректе импульс қосымша өткізетін Кент шоғыры әсерінен болады. Ол ритм бұзылуына әкеледі.

- Бұл қосымша шоғыры сырқат адамдарда туылғанынан болады. Бірақ алғашқы симптомдары жасөспірім кезеңде пайда болады.

ВПВ синдромы симптомдары:

- Пульс жиіленуі;
- жүрек соғысы тез;
- Басы айналуы;
- Физикалық күш түскенде тез әлсіреу;
- Есінен тану;






- ВПВ синдромы— туа пайда болған. Қосымша шоғыры пайда болуы-генетикалық. Ритм бұзылысы бірнеше секундтан сағаттарға созылады. Көп жағдайда күш түскенде пайда болады. Симптом көрінуі дәрі-дәрмек қабылдағаннан немесе темекі шегу әсерінен.

- Ритм жүректе синусты түйін арқылы шығады. Ол оң жақ жүрекшеде орналасқан(сондықтан дұрыс ритм синусты ритм деп аталады). Одан соң импульс АВ түйінге беріледі, ол жүрекше мен қарынша арасында орналасқан. Осы жерде импульс берілуі шамалы уақытқа тоқтайды, ол жүрекшеден қан толық қарыншаға өтіп қандануы үшін болады. Жүрекшемен қарынша арасында қосымша импульс өткізуші жол арқылы жүрекшеден қан қарыншаға тез өтіп қарынша дұрыс қан келмеу әсерінен қарынша тез жиырылып ритм бұзылуы болады. (жүрек лақтырысы төмендейді)

Движение
импульса при
тахикардии,
обусловленной
синдромом
WPW



Дополнительный
путь проведения

- ВПВ синдромы басқа жүрек ақауларымен қаппатасып жүргенде симптомдар мынадай болады:
- Кеуде қуысы қатты ауыруы.
- Ентікпе.
- Кенеттен өлім.
- Кейде симптомсыз өтіп ЭКГ да ғана көрінеді.

Емі:

- Нейрохирургиялық
- антиаритмиялық препараттар (аритмия түріне байланысты әртүрлі — амиодарон, флекаинид, пропафенон, аденозин) немесе ритм бәсеңдететін препараттар (бета-блокаторлар, эсмолол) көк тамырға енгізеді.
- Хирургиялық

Қолданылған әдебиеттер:



hadassah-hospital.ru/