

Теорема Менелая

Выполнили:
Кустова Юлия
Корнева Дарья


Теорема Менелая или теорема о полном четырёхстороннике — это классическая теорема аффинной геометрии.

Эта теорема доказывается в третьей книге «Сферики» Менелая Александрийского (ок. 100 н. э.). Менелай сначала доказывает теорему для плоского случая, а потом центральным проектированием переносит её на сферу. Возможно, что плоский случай теоремы рассматривался ранее в не сохранившихся «Элементарных» Евклида.

Аффинная геометрия (лат. *affinis* — родственный) — раздел геометрии, в котором изучаются свойства фигур, инвариантные относительно аффинных преобразований. Например, отношение направленных отрезков, параллельность прямых и т. п.

Сферическая теорема Менелая была основным средством, с помощью которого решались разнообразные прикладные задачи позднеантичной и средневековой астрономии и геодезии.

Аффинное преобразование (от ла т. *affinis* — соприкасающийся, близкий, смежный) — отображение плоскости или пространства в себя, при котором прямые переходят в прямые.




Красный треугольник переходит в синий при аффинном преобразовании $(x,y) \rightarrow (y-100; 2 \cdot x + y-100)$, если новые координаты отобразить в прежнем базисе

Формулировка

Если точки A' , B' и C' лежат соответственно на сторонах BC , CA и AB треугольника $\triangle ABC$ или на их продолжениях^[1], то они коллинеарны тогда и только тогда, когда

$$\frac{AB'}{B'C} \cdot \frac{CA'}{A'B} \cdot \frac{BC'}{C'A} = -1.$$

где $\frac{AB'}{B'C}$, $\frac{CA'}{A'B}$ и $\frac{BC'}{C'A}$ обозначают отношения направленных отрезков.



В частности, из теоремы следует соотношение для длин:

$$\frac{|AB'|}{|B'C|} \cdot \frac{|CA'}{|A'B|} \cdot \frac{|BC'|}{|C'A|} = 1.$$

Коллинеарные точки. Набор точек, находящихся на одной прямой.

Доказательство

Треугольники AC_1B_1 и CKB_1 подобны ($\angle C_1AB_1 = \angle KCB_1$, $\angle AC_1B_1 = \angle CKB_1$). Следовательно,

$$\frac{AC_1}{CK} = \frac{B_1A}{B_1C}.$$

Треугольники BC_1A_1 и CKA_1 также подобны ($\angle BA_1C_1 = \angle KA_1C$, $\angle BC_1A_1 = \angle CKA_1$). Значит,

$$\frac{C_1B}{CK} = \frac{BA_1}{A_1C}.$$


Из каждого равенства выразим CK :

$$CK = \frac{AC_1 \cdot B_1C}{B_1A} = \frac{C_1B \cdot A_1C}{BA_1},$$

откуда

$$\frac{AC_1}{C_1B} \cdot \frac{BA_1}{A_1C} \cdot \frac{CB_1}{B_1A} = 1,$$

что и требовалось доказать.



Теорема (обратная теорема Менелая). Пусть дан треугольник ABC . Пусть точка C_1 лежит на стороне AB , точка A_1 – на стороне BC , а точка B_1 – на продолжении стороны AC , причем выполняется соотношение

$$\frac{AC_1}{C_1B} \cdot \frac{BA_1}{A_1C} \cdot \frac{CB_1}{B_1A} = 1.$$

Тогда точки A_1 , B_1 и C_1 лежат на одной прямой.

Доказательство. Заметим для начала, что $\frac{AC_1}{C_1B} \cdot \frac{BA_1}{A_1C} \neq 1$, поскольку, по условию, это выражение равно $\frac{B_1A}{CB_1} \neq 1$.

Следовательно, прямые A_1C_1 и AC не параллельны.

Проведем прямую через точки C_1 и A_1 . Она пересечет прямую AC в некоторой точке B_2 . Для точек A_1 , C_1 и B_2 справедлива теорема Менелая, так что

$$\frac{AC_1}{C_1B} \cdot \frac{BA_1}{A_1C} \cdot \frac{CB_2}{B_2A} = 1.$$

Отсюда следует, что

$$\frac{CB_2}{B_2A} = \frac{BC_1}{C_1A} \cdot \frac{CA_1}{A_1B} = \frac{CB_1}{B_1A}.$$

Из этого равенства следует, что обе точки B_1 и B_2 лежат на продолжении отрезка AC за одну и ту же точку, ибо правее C данное отношение меньше 1, а левее A оно строго больше 1. Пусть $CB_1 = x$, $CB_2 = y$, $AC = b$. Тогда, учитывая, что $B_1A = x + b$ и $B_2A = y + b$, перепишем полученное равенство в виде


$$\frac{x}{x+b} = \frac{y}{y+b} \Leftrightarrow xy + xb = xy + yb \Leftrightarrow x = y.$$

Из равенства $CB_1 = CB_2$ следует, что $B_1 = B_2$, и доказано, что точка B_1 , совпадающая с B_2 , лежит на прямой A_1C_1 .

Замечание. Теоремы Менелая (прямая и обратная) верны также и в том случае, когда все три точки A_1, B_1, C_1 лежат на продолжениях сторон треугольника ABC . То есть справедлива следующая

Теорема. Пусть дан треугольник ABC . Точки A_1, B_1, C_1 лежат на продолжениях сторон BC, AC и AB соответственно. Три точки A_1, B_1 и C_1 лежат на одной прямой тогда и только тогда, когда выполняется равенство

$$\frac{AC_1}{C_1B} \cdot \frac{BA_1}{A_1C} \cdot \frac{CB_1}{B_1A} = 1.$$



Доказательство этой теоремы точно такое же, как и доказательство, приведенное выше.