


Тетанотоксин

Определение

Тетанотоксин - чрезвычайно сильнодействующий нейротоксин, продуцируемый микроорганизмами *Clostridium tetani* в анаэробных условиях, является причиной мышечных спазмов при столбняке



- Тетанотоксин - физиологически активное вещество (ФАВ), исследовавшееся за рубежом в военных целях (З. Франке, 1973, В.К. Курочкин и соавт., 1994).
- Боевое применение тетанотоксина маловероятно. Это вещество может рассматриваться лишь в качестве возможного диверсионного агента.



СВОЙСТВА

Критерий	Характеристика
Растворимость в воде	растворяется
При нагревании	Не устойчив
Смертельная доза	менее 0,2 - 0,3 мг

Токсикокинетика

- В желудочно-кишечном тракте быстро разрушается → при поступлении per os не действует
- Через неповрежденную кожу в организм не проникает
- Будучи белком, вещество не проникает через ГЭБ.
- в двигательные ядра ЦНС поступает с помощью механизма ретроградного аксонального тока по волокнам нервных стволов, с окончаниями которых специфично связывается

Механизм действия

Тетанотоксин

=

Тетаноспазмин

+

Тетанолизин


+

Низкомолекулярная фракция

Поражает нервную систему

Вызывает гемолиз эритроцитов

усиливает секрецию медиатора в нервно-мышечных синапсах




- Установлено, что тетанотоксин блокирует выброс тормозных нейромедиаторов ГАМК и глицина нервными окончаниями соответствующих нейронов ЦНС
- В результате выключается тормозной компонент двигательного акта, а процессы возбуждения остаются на прежнем уровне активности.

Проявления интоксикации

- Скрытый период = неск-ко часов – 3 и более суток

Головная боль, мышечная боль, лихорадка, повышение потливости, слабость, сонливость → возбуждение, чувство страха, тризм жевательной мускулатуры, а затем приступы клонико-тонических судорог



<https://pohlmlita.by/>

Мероприятия медицинской защиты

Профилактические

организация профилактических прививок



Лечебные

- своевременное выявление пораженных;
- применение средств патогенетической и симптоматической терапии пострадавшим
- подготовка и проведение эвакуации.



- На догоспитальном этапе при выявлении пораженных перед их эвакуацией, с целью профилактики судорожного синдрома, необходимо ввести **нейроплегическую смесь**:
2,5% раствор аминазина - 2,0; 2% раствор пантопона - 1,0; 2% раствора димедрола - 2,0; 0,05% раствора скополамина - 0,5. Через 30 минут внутримышечно - 5-10 мл 10% раствора гексенала.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

