

Плевральная пункция




Выполнил: Ушуров А.А.
Группа: 707-2


Пункцию плевры осуществляют с целью удаления либо экссудата, либо воздуха при пневмотораксе. В первом случае местом для пункции плевральной полости являются седьмое или восьмое межреберье между лопаточной и средней подмышечной линиями.

Подготовка пациента:


1. Психологическая.
2. За 30 – 60 мин. Проводится премедикация, с целью успокоить пациента и усилить действие местных анестетиков.
3. Местная анестезия.
4. Обработка места прокола 3кратно – спирт, йод, спирт.



Воздух удаляют, проводя пункцию плевральной полости во втором или третьем межреберье по среднеключичной линии. И в том, и в другом случае иглу вкалывают по верхнему краю нижележащего ребра.




2. 0,5 – 0,25% р- р Новокаина, шприц, спиртовые ватные шарики.
3. Спирт, йод, ватные шарики – для обработки места прокола.
4. Пункционная игла, на конце которой резиновая трубка, зажим, шприц, стеклянные пробирки.
5. Асептическая повязка.



Алгоритм действия.


1. Провести психологическую подготовку пациента
2. За 30 – 60 мин. провести премедикацию.
3. Усадить пациента лицом к спинке стула, руки на спинку стула, торс наклонен вперед.
4. Провести местную анестезию.
5. Обработать место прокола (7-8 межреберье по верхнему краю ребра)
6. Врач вводит иглу, убирают зажим. Оттягивают поршень, содержимое выливают в пробирки (закрывают зажим, отсоединяют шприц) вынимают иглу.
7. На место прокола асептическую повязку.
8. Пациента транспортируют на кресле-каталке, несколько часов постельный режим лежа на животе.



Плевральная пункция с лечебной целью.

Необходимо приготовить:

1. Атропин 0,1% - 1 мг. , Димедрол 0,1% - 1 мг, наркотическое средство, шприц, спиртовые ватные шарики – для премедикации.
2. 0,5 – 0,25% р- р Новокаина, шприц, спиртовые ватные шарики.
3. Спирт, йод, ватные шарики – для обработки места прокола.
4. Пункционная игла, на конце которой резиновая трубка, зажим, шприц, стеклянные пробирки.
5. Асептическая повязка.
6. Аппарат Боброва и плевроаспиратор.



Алгоритм действия.

1. Провести психологическую подготовку пациента
2. За 30 – 60 мин. провести премедикацию.
3. Усадить пациента лицом к спинке стула, руки на спинку стула, торс наклонен вперед.
4. Провести местную анестезию.
5. Обработать место прокола (7-8 межреберье по верхнему краю ребра)
6. Врач вводит иглу, убирает зажим, откачивают воздух из емкости, закрывают кран на наконечнике, убирают зажим со стороны иглы, откачивают жидкость. Зажим закрывают в обратном порядке, вынимают иглу.
7. На место прокола асептическую повязку.
8. Пациента транспортируют на кресле-каталке, несколько часов постельный режим лежа на животе.

