




# Твердые лекарственные формы

Лекарственные формы — формы, придаваемые лекарственным средствам для удобства их применения.



Уильям Ослер

Желание принимать лекарства, возможно, главное, что отличает человека от других животных.

# ТАБЛЕТКА



ТАБЛЕТКА – твердая дозированная лекарственная форма, предназначена для приема внутрь, а также для приготовления порошков и растворов для наружного и внутреннего применения, изготавливают методом прессования.

Таблетка содержит лекарственные и вспомогательные вещества: сахар, крахмал, какао, вода.

Таблетка, как правило, принимается *per os*. Это самый простой и распространенный путь введения лекарственных веществ, но не лишен недостатков.

tabuletta - Им.п. ед.ч.  
tabulettae – Им.п. мн.ч.; Р.п. ед.ч.  
tabulettas – В.п. мн.ч.  
in tabulettis - in tab.  
Da tales doses N 10 in tabulettis. –  
D.t.d.N10 in tab.



При выписывании таблеток используют две формы прописи.

1. Выписать 20 таблеток, содержащих по 0,1 фенобарбитала. Назначить по 1 таблетке за 40 минут до сна.



**Развернутая пропись:**

Rp.: Phenobarbitali 0,1

D.t.d.N 20 in tab.

S. По 1 таблетке за 40 минут до сна.

**Сокращенная пропись:**

Rp.: Tabulettas Phenobarbitali 0,1

D.t.d.N20

S. По 1 таблетке за 40 минут до сна.

Если таблетка состоит из нескольких компонентов и необходимо указать дозировку каждого компонента, то используют только **развернутую форму прописи.**

2. Выписать 10 таблеток, содержащих по 0,25 г анальгина и амидопирина.  
Назначить по 1 таблетке 3 раза в день.

Rp.: Analgini  
Amidopyrini aa 0,25  
D.t.d.N 10 in tab.  
S. По 1 таблетке 3 раза в день.



Если таблетка состоит из нескольких компонентов и необходимо указать дозировку каждого компонента, то используют только развернутую форму прописи.

2. Выписать 10 таблеток, содержащих по 0,25 г анальгина и амидопирина. Назначить по 1 таблетке 3 раза в день.

Rp.: Analgini  
Amidopyrini aa 0,25  
D.t.d.N 10 in tab.  
S. По 1 таблетке 3 раза в день.



Существуют таблетки, в состав которых входят несколько лекарственных веществ и которые имеют специальное коммерческое название: “Ascorphenum”, “Citramonum”, “Vicalinum” и т.д. При выписывании таких таблеток пропись начинают со слова Tabulettas (В.п.мн.ч.), затем указывают название таблеток а именительном падеже в кавычках и их количество.

3. Выписать 20 таблеток «НикOVERина». Назначить по 1 таблетке 3 раза в день.

Rp.: Tabulettas “NicoVerinum” N 20  
D.S. По 1 таблетке 3 раза в день.



## МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ

А	Б	В	Г	Д
Е	Ж	З	И	Й
К	Л	М	Н	О
П	Р	С	Т	У
Ф	Х	Ц	Ч	Ш
Щ	Ъ	Ы	Ь	Э
Ю	Я			

# ПОРОШКИ

**pulvis** – Им.п.ед.ч.

**pulveris** - Р.п.ед.ч.

Различают порошки :

простые (состоящие из одного вещества) – **pulvis simplex**

сложные – (состоящие из нескольких веществ) – **pulvis compositus**

разделенные на отдельные дозы – **pulvis divisus**

неразделенные на отдельные дозы порошки - **pulvis indivisus**.





# Простой неразделенный порошок

- »» 1. Выписать 30г магния окиси. Назначить по  $\frac{1}{4}$  чайной ложке через 2 часа после еды. (при повышенной кислотности)

Rp.: Magnesii oxydi 30,0

D.S. По  $\frac{1}{4}$  чайной ложке через 2 часа после еды.



# Простой разделенный порошок:



2. Выписать 20 порошков панкреатина по 0,5г в порошок. Назначить по 1 порошку 3 раза в день за 30 минут до еды. (при панкреатитах)

**Rp.: Pancreatini 0,5**

**D.t.d.N20**

**S. По 1 порошку 3 раза в день за 30 минут до еды.**



# Сложный разделенный порошок:



Масса разделенного на отдельные дозы порошка не должна быть меньше 0,1г. Если она меньше, то в порошок добавляют сахар (0,2-0,3г на один порошок).

3. Выписать 30 порошков, содержащих по 0,01г тиамин бромид в одном порошке. Назначить по 1 порошку 3 раза в день.

Rp.: Thiamini bromidi 0,01

Sacchari 0,2

M.f.pulvis

D.t.d.N30

S. По 1 порошку 3 раза в день.



4. Выписать 20 порошков анальгина (Analginum) по 0,25г в порошке. Назначить по 1 порошку при головной боли.

5. Выписать 20 порошков бромурала (Bromuralum) по 0,3г. Назначить по 1 порошку за 30 минут до сна (снотворное, успокаивающее средство)



МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ				
А	Б	В	Г	Д
Е	Ж	З	И	Й
К	Л	М	Н	О
П	Р	С	Т	У
Ф	Х	Ц	Ч	Ш
Щ	Ъ	Ы	Ь	Э
	Ю	Я		

# ДРАЖЕ

- »» Драже изготавливают заводским способом путем многократного наслаивания лекарственных и вспомогательных веществ на сахарные гранулы.

Существуют две формы прописи драже:



Выписать 20 драже, содержащих по 0,05г  
диазолина. Назначить по 1 драже 3 раза в день  
(противогистаминное средство)

**Развернутая форма прописи:**

Rp.: Dragee Diazolini 0,05

D.t.d.N20

S. По 1 драже 3 раза в день

**Сокращенная форма прописи:**

Rp.: Dragee Diazolini 0,05 N20

D.S. По 1 драже 3 раза в день



2. Выписать 20 драже аминазина (Aminazinum) по 0,25г в драже. Назначить по 1 драже 3 раза в день.
3. Выписать 50 драже курантила (Curantilum) по 0,25г в драже. Назначить по 1 драже 3 раза в день. (при стенокардии)
4. Выписать 20 драже, содержащих по 0,002г рибофлавина (Riboflavinum). Назначить по 1 драже 3 раза в день. (витамин)

