




ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ С

Вирусная антропонозная кровяная инфекция, которая в клинически выраженных случаях характеризуется симптомами острого поражения печени, протекающего с умеренной интоксикацией.



ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ С

- Отличается выраженной склонностью к развитию хронических форм (в 50-70%), при этом у 20% хронически инфицированных может возникнуть цирроз печени с последующим развитием гепатоцеллюлярной карциномы. У 20-30% переболевших острым гепатитом отмечается вирусоносительство.

ЭТИОЛОГИЯ

- Возбудителем является Нерасавирус, имеющий 6 основных генотипов.



ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

- От 2 до 26 недель (в среднем 8-10 недель) в зависимости от концентрации вируса в инфицирующем материале и состояния макроорганизма.

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ

- Больные всеми формами острого и хронического гепатита С, а также вирусоносители.



ПЕРИОД ЗАРАЗИТЕЛЬНОСТИ

- Больной опасен в инкубационном, продромальном и желтушном периоде, а также при хронизации инфекционного процесса и развитии вирусоносительства.

МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ

- Естественный:
- Вертикальный (интранатальный, трансплацентарный),
- Половой.

МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ

- Артифициальный
- Наркотики
- Медицинские манипуляции (гемотрансфузии, инъекции, оперативные вмешательства, инвазивные диагностические и лечебные процедуры)
- Немедицинские процедуры (татуировки, бритье)



КОНТИНГЕНТЫ РИСКА

- Медицинские работники
- Наркоманы (в/в)
- Пациенты с трансплантацией органов и тканей
- Реципиенты крови
- Больные гемофилией и лица, находящиеся на гемодиализе
- Пациенты хирургических стационаров

ПРОФИЛАКТИКА

- Тщательный отбор доноров
- Профилактика наркоманий
- Соблюдение противоэпидемического режима
- Строгое обоснование диагностических парентеральных процедур

ПРОФИЛАКТИКА

- Использование одноразового инструментария
- Тщательная предстерилизационная обработка и стерилизация медицинского инструментария
- Вакцинация групп риска
- Профилактическая работа в семейных очагах, в школах, среди молодежи
- Гигиеническое и половое воспитание

