

A photograph of a wolf standing in a snowy field. The wolf has a thick, grey and white coat and is looking towards the right. The background shows a line of trees under a clear blue sky.

ВОЛК

ВИДЫ



- подвид вида волк обыкновенный (*Canis lupus*), один из нескольких подвидов, обитающих в России. Ареал тундрового волка занимает зону тундры и лесотундры европейской части и Сибири вплоть до арктического побережья, а также Камчатки. Вопреки распространённому мнению, тундровый волк не является самым крупным из подвидов волка, уступая по этому критерию полярному волку. Размещение волков по тундре определяет размещение оленей.

ТУНДРОВЫЙ ВОЛК

CANIS LUPUS ALCES

- ▣ вымерший подвид волка (*Canis lupus*), некогда обитавший на территории полуострова Кенай, расположенного на южной Аляске. Найденные останки позволяют сделать вывод, что животное было около 210 см длиной, не считая хвоста, которой достигал в длину 60 см. Большой рост (110 см) и вес (более 90 кг) помогали этому подвиду волка в охоте на лосей, населяющих полуостров. Считается, что это был крупнейший представитель псовых. *C.l.alces* был впервые описан в 1944 году американским зоологом Эдвардом Голдманом как один из четырёх подвидов Аляски[3].
- ▣ *C.l.alces* регулярно наблюдали с начала 1890-х, когда в эти места прибыли поселенцы, движимые Золотой лихорадкой. В результате охоты и применения стрихнина к концу 1910-х популяция волка была практически полностью уничтожена.
- ▣ Разрозненные сообщения о наблюдении волков на протяжении 1940-х не подтверждались до 1960-х. Однако неизвестно, были ли это новые группы волков, представляющие другие аляскинские подвиды, или это, возможно, потомки немногих выживших *C.l.alces*. Генетические исследования показали, что *C.l.alces*, как минимум, был связан с другими подвидами волков Аляски.



- подвид вида волк обыкновенный (*Canis lupus*), который ранее встречался по всей территории Аравийского полуострова, однако теперь живёт на ограниченных ареалах в южном Израиле, Омане, Йемене, Иордании, Саудовской Аравии и, возможно, в некоторых частях Синайского полуострова в Египте.

АРАВИЙСКИЙ ВОЛК



- также иногда именуется элсмирский или арктический — подвид волка, встречающийся на группе арктических островов в Северной Америке и в северной части Гренландии. В честь одного из них, Мелвилла, подвид получил своё название (аналогично, элсмирский в честь острова Элсмир). Особь данного подвида выделяется светлым белым или серым мехом.

МЕЛВИЛЬСКИЙ ОСТРОВНОЙ ВОЛК



МЕКСИКАНСКИЙ ВОЛК

- один из малых подвигов североамериканского серого волка. Масса тела взрослой особи — от 23 до 41 килограммов, длина тела — от 1,4 до 1,7 метра, рост — от 66 до 81 сантиметров.
- Окрас у мексиканского волка серый или темно-серый. Из всех волков мексиканский волк обладает самой длинной гривой.



- вымерший подви́д серого волка. Ареал охватывал остров Ньюфаундленд и восточный берег Канады. По описаниям, это был крупный белый волк с черной полосой вдоль позвоночного хребта.
- В настоящее время экологическая ниша ньюфаундлендского волка занята койотами.

НЬЮФАУНДЛЕНДСКИЙ ВОЛК

ПУСТЫННЫЙ ВОЛК

- небольшой волк, обитающий в степи и пустынях Средней Азии. Имеет короткую жёсткую шерсть бледно-серого цвета с вкраплениями цвета охры. В целом несколько мельче лесного, с более редким и грубым волосом. В его ареал входят степи Казахстана и юга России, в том числе Предкавказские, Прикаспийские, Приуральские и Нижнего Поволжья. Изучен слабо. Не разработана система определённых признаков. Численность невысока, особенно в западных частях ареала.



- один из подвигов серого волка (*Canis lupus*). Эндемик острова Ванкувер. Окрас серый или чёрный. Эти животные ведут социальный образ жизни, проживают в стаях, насчитывающих от 5 до 35 особей. Основу питания составляют чернохвостые олени (*Odocoileus columbianus*) и олени Рузвельта (*Cervus elaphus roosevelti*).
- Ванкуверские волки по своему характеру очень пугливые, редко встречаются с людьми. Находятся под угрозой вымирания. В национальном парке Пасифик-Рим они нападают на незащищённых домашних собак. В Ванкуверском зоопарке содержатся два ванкуверских островных волка, один из них белого, а другой серого цвета.

ВАНКУВЕРСКИЙ ОСТРОВНОЙ ВОЛК



- вторично одичавшая домашняя собака, единственный плацентарный хищник в фауне Австралии до прихода европейцев. Название «динго» возникло в начале европейской колонизации Нового Южного Уэльса и, по всей вероятности, происходит от «тинго» — термина, использовавшегося аборигенами Порт-Джексона для описания своих собак.

ДИНГО



- домашнее животное, одно из наиболее распространённых (наряду с кошкой) «ЖИВОТНЫХ-КОМПАНЬОНОВ».

СОБАКА



- подвид волка, одичавшая собака. Обитает в лесах Новой Гвинеи. Классификация спорная, иногда считается отдельным видом, *Canis hallstromi*, иногда считается тем же подвидом, что и динго.

НОВОГВИНЕЙСКАЯ ПОЮЩАЯ СОБАКА

- название двух подвигов вида волка обыкновенного (*Canis lupus*), обитавших на островах Японии. В принятой классификации этот термин относится к волку Хоккайдо (*Canis lupus hattai*), (蝦夷狼, Ezo-ōkami), также известному как волк Эдзо, обитавшему на острове Хоккайдо. Второй подвид — Волк хондосский японский или волк Хонсю (*Canis lupus hodophilax*).



ЯПОНСКИЙ ВОЛК



- светлоокрашенный волк средней величины, на зиму линяющий в белый цвет. Его иногда называют тундровым волком. Гудзонский волк обитает к западу и северу от Гудзонова залива. Волк ведёт кочевой образ жизни, мигрируя на юг вместе со стадами оленей карибу.

ГУДЗОНСКИЙ ВОЛК



- подвид волка серого (*Canis lupus*). Первоначально распространился по большей части Евразии с ограничением на юге Гималаями, Гиндукушем, Копетдагом, Кавказом, Чёрным морем и Альпами, и ограничением на севере между 60° и 70° северной широты, это заставило отступить популяцию волка назад из большей части Западной Европы и восточного Китая, которая продолжила существовать преимущественно в Центральной Азии. В настоящее время обыкновенный волк имеет наибольшее распространение среди всех подвидов волка и обитает в основном в Европе и Азии, простираясь через Западную Европу, Скандинавию, Россию, Китай, Монголию, Азербайджан и Гималайские горы.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ВОЛК



- хищное животное рода волков, обитающее на юго-востоке провинции Онтарио и юго-западе провинции Квебек (Канада). Классификация восточного волка неоднозначна: хотя чаще всего его считают подвидом серого волка (лат. *Canis lupus lycaon*), есть также мнения, выделяющие его в отдельный вид *Canis lycaon* или рассматривающие как гибрид серого и рыжего волка или серого волка и койота.

ВОСТОЧНЫЙ ВОЛК

ВОЛК ВЕЛИКИХ РАВНИН

- Когда-то ареал этого подвида охватывал поперёк запад США и юг Канады. Однако к 30-м годам XX века этот подвид был почти полностью уничтожен. В 1974 году он был внесён в список вымирающих животных, и с тех пор численность волка Великих Равнин увеличивалась. В 2004 году популяция насчитывала 3700 особей, живущих в штатах Миннесота, Мичиган и Висконсин. Об отдельных волках сообщили в Дакоте и даже на юге в Небраске, но как предполагают, это особи, отбившиеся от своих стай.
- Этот подвид стал сторониться людей, вторгающихся на их территорию.



- также известный как Волк Скалистых гор, Аляскинский волк или Канадский волк — вероятно, самый большой подвид волка в Северной Америке. Его ареал включает западные части США, большую часть Западной Канады, Аляску, остров Унимак Алеутского архипелага, Йеллоустон и центральный Айдахо.

МАКЕНЗИЙСКИЙ РАВНИННЫЙ ВОЛК



- подвид серого волка, который обитает на территории Ливана, Турции, Ирана, Афганистана, Пакистана, Сирии, Индии и других близлежащих регионов.

АЗИАТСКИЙ ВОЛК



- хищное млекопитающее, подви́д обыкновенного волка. Ранее считался отдельным видом *Canis rufus*. Не стоит путать с красным волком (*Canis alpinus*).

РЫЖИЙ ВОЛК



- среди местных жителей известный как Lobo, — подви́д обыкновенного волка, который населяет леса и равнины северной Португалии и северо-западной Испании.

ИБЕРИЙСКИЙ ВОЛК

ПОЛЯРНЫЙ ВОЛК

- подвид волка. Обитает на всей территории Арктики и в тундре, за исключением льдин и больших территорий, покрытых льдом.