

Язвенно-некротические поражения СОПР

Выполнила: Шабунина Алена


Этиология симбиоза:

Веретенообразные бациллы и спирохеты Венсана - сапрофиты полости рта, обнаруживаются в криптах небных миндалин, в кариозных зубах и десневых карманах.

Заболевание чаще возникает в молодом возрасте у ослабленных лиц, в том числе детей, у которых эти микробы становятся патогенными.



Веретенообразные
бациллы



Спирохеты

Язвенно-некротический стоматит Венсана

Предрасполагающие факторы:

- ослабление организма,
- неполноценное питание,
- авитаминоз,
- курение,
- злоупотребление алкоголем,
- переутомление.
- **Основной фактор** плохая гигиена полости рта и не санированная полость рта.
- **Имеет значение**
- нарушение целостности слизистой оболочки рта,
- наличие воспалительного процесса в пародонте.
- Одновременно со слизистой оболочкой рта могут поражаться половые органы.

Клиника стоматита Венсана:

Образование кратерообразной язвы, покрытой некротическими массами грязно-желтого цвета, легко удаляющиеся. Края язвы неровные, красного цвета, без выраженного уплотнения. Язва может достигать 2—4 см в диаметре. Вблизи основной язвы могут образоваться мелкие язвочки. Слизистая оболочка вокруг язвы отечна и гиперемирована. При переходе воспалительного процесса на слизистую оболочку альвеолярного отростка десневой край отекает, на поверхности десны появляются обильные некротические массы, при снятии которых обнажаются язвы, легко кровоточащие в области краев и дна.

Прогноз заболевания благоприятный.



Figure 8-11. Vincent's stomatitis, showing a large ulcer affecting the lower lip.



Общие симптомы:

Постоянный симптом: неприятный гнилостный запах изо рта.

Регионарные лимфатические узлы могут быть увеличены и болезненны.


Процесс сопровождается подъемом температуры тела до $37,5—38^{\circ}\text{C}$, особенно в первые 2—3 дня заболевания.

Ложноплечатая ангина Венсана

Локализация:

- на миндалинах, образуется толстая желтовато-серая пленка, иногда переходит в хроническую форму. Через 2-3 недели наступает разрешение процесса, где сохраняется гнойно-некротический процесс.

Язвенно-некротические поражения бывают при:

- ВИЧ инфекция
 - МЭЭ
 - Кандидоз
 - Пузырчатка
 - КПЛ
 - Синдром Лайела
- 

Неотложная помощь:

- ▣ Антисептическая обработка полости рта теплым раствором 0,05% хлоргексидина;
 - ▣ Обезболивание;
 - ▣ Антисептическая обработка пораженного участка теплым раствором 0,05% хлоргексидина;
 - ▣ Снятие налета ферментами;
 - ▣ Назначение противовоспалительных мазей (Метрогил-дента).
- 