

Задержка психического
развития с
невропатоподобным
синдромом

ЗПР с невропатоподобным синдромом – это

легкая органическая
недостаточность мозга,
возникшая на ранних этапах
онтогенеза, которая может
приводить к задержке развития
некоторых высших психических
функций .

На фоне симптоматики
напоминает невропатию
(врожденная детская нервность).

Темпы раннего психомоторного развития

обычно в пределах нормы, но есть особенности поведения:

- С грудного возраста крикливы, капризны и слишком подвижны
- При легких нарушениях режима возникнуть соматовегетативные нарушения, такие как: нарушение чередования сна и бодрствования, беспокойный сон, ночные страхи, энурез и др.

- ❖ В ясельном и дошкольном возрасте – эмоциональная неустойчивость (лабильность), плаксивость, обидчивость, повышенная впечатлительность
- ❖ В конфликтных ситуациях возможны невротические реакции
- ❖ При интеллектуальном напряжении обнаруживается быстрая истощаемость произвольного внимания. На уроках – суетливы, излишне отвлекаются
- ❖ Конфликтны с учителями, ровесниками
Конфликты кончаются плачем, криком и драками

Неудачи в учёбе вызывают новые
невротические реакции – возникает
страх перед посещением школы и
ответами у доски



Особенности при обследовании:

В неврологическом статусе:

симптомы дисфункции вегетативной
нервной системы

симптомы раздражительной слабости,
повышенной истощаемости,
эмоциональной неустойчивости

На энцефалограмме регистрируются
диффузные, негрубые
биоэлектрические активности
головного мозга.

На фоне невротической симптоматики обнаруживается легкое недоразвитие сторон некоторых психических функций :

- затруднены операции конструктивного характера;
- реализация последовательных рядов преимущественна на вербальном уровне;
- Негрубые проявления дислексии, дисграфии, дискалькулии...



При оказании своевременной помощи, прогноз
динамики развития таких детей
благоприятный .

