

ЗАКРЫТАЯ ТРАВМА ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА

Выполнила: Каспирова Н. Ю., ОП -
508

Классификация закрытых повреждений живота

- I. 1) ушибы стенки брюшной полости,
2) кровоизлияния (гематомы) стенки брюшной полости,
3) гематомы забрюшинного пространства.

II. Закрытые травмы живота с повреждением органов брюшной полости:

- 1) повреждения паренхиматозных органов,
2) полых органов,
3) сочетанные повреждения паренхиматозных и полых органов,
4) повреждения крупных сосудов.

III. Закрытые повреждения органов забрюшинного пространства (почек, мочеточника, крупных сосудов).

Травмы почек и мочеточников

Характер повреждения

- Ушиб
- Трещина паренхимы, не достигающая лоханки или чашечки
- Глубокие разрывы паренхимы
- Отрывы части органа
- Отрыв почки от сосудов и мочеточника

Травмы почек и мочеточника

Клиника

- Боль и припухлость в поясничной области
- Гематурия
- Напряжение мышц передней брюшной стенки
- Симптом раздражения брюшины
- Дизурические расстройства

Повреждения мочеточника

- Менее выраженная симптоматика
- Диагноз установить не просто
- Диагностика:
хромоцистография, урография

Повреждения поджелудочной железы

Характер повреждения

- Ушиб и гематома без повреждения капсулы
- Частичные и полные разрывы железы

Повреждения поджелудочной железы

Клиника

- патогномонична острая боль в эпигастральной области с иррадиацией в спину
- Через несколько часов – клиника острого панкреатита:
 - опоясывающие боли,
 - рвота,
 - вздутие живота,
 - частый пульс,
 - снижение артериального давления

Забрюшинные гематомы



- Возникают в результате разрыва венозной сети забрюшинного пространства
- Составляют до 28% от числа закрытых травм живота

Забрюшинные гематомы



- Чаще образуются при переломах костей таза и позвоночника
- Сопровождаются парезом кишечника
- Болями в животе
- Напряжением мышц передней брюшной стенки
- Нечетко выраженным симптомом Щеткина-Блюмберга

Диагностика



- Общий анализ крови
- Общий анализ мочи
- УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства
- Хромоцистография
- Урография

ЛЕЧЕНИЕ

- Органосохраняющие операции при неполных разрывах паренхимы почки
- Нефрэктомия – при обширных размозжениях и отрывах почек
- Оперативное вмешательство заканчивается дренированием брюшной полости
- В послеоперационном периоде – назначение антибактериальной, инфузионной, обезболивающей терапии.

